

GYMNASE DE BURIER

## Chapitre 6 - Fonctions Affines

Sarah Dégallier Rochat

# 1. Les fonctions linéaires

Exemple 1.1 Un litre d'essence coûte 1.50. Quel est le prix de :

1. ... 2 litres d'essence ?

# 1. Les fonctions linéaires

Exemple 1.1 Un litre d'essence coûte 1.50. Quel est le prix de :

1. ... 2 litres d'essence ?  $y = 1.5 \cdot 2 = 3.-$

# 1. Les fonctions linéaires

Exemple 1.1 Un litre d'essence coûte 1.50. Quel est le prix de :

1. ... 2 litres d'essence ?  $y = 1.5 \cdot 2 = 3.-$
2. ... 10 litres ?

# 1. Les fonctions linéaires

Exemple 1.1 Un litre d'essence coûte 1.50. Quel est le prix de :

1. ... 2 litres d'essence ?  $y = 1.5 \cdot 2 = 3.-$

2. ... 10 litres ?  $y = 1.5 \cdot 10 = 15.-$

# 1. Les fonctions linéaires

Exemple 1.1 Un litre d'essence coûte 1.50. Quel est le prix de :

1. ... **2** litres d'essence ?  $y = 1.5 \cdot 2 = 3.-$

2. ... **10** litres ?  $y = 1.5 \cdot 10 = 15.-$

3. ...  **$x$**  litres ?

# 1. Les fonctions linéaires

Exemple 1.1 Un litre d'essence coûte 1.50. Quel est le prix de :

1. ... **2** litres d'essence ?  $y = 1.5 \cdot \mathbf{2} = 3.-$

2. ... **10** litres ?  $y = 1.5 \cdot \mathbf{10} = 15.-$

3. ...  **$x$**  litres ?  $y = 1.5 \cdot \mathbf{x}$

# 1. Les fonctions linéaires

Exemple 1.1 Un litre d'essence coûte 1.50. Quel est le prix de :

1. ... **2** litres d'essence ?  $y = 1.5 \cdot \mathbf{2} = 3.-$

2. ... **10** litres ?  $y = 1.5 \cdot \mathbf{10} = 15.-$

3. ...  **$x$**  litres ?  $y = 1.5 \cdot \mathbf{x} = 1.5x$



# 1. Les fonctions linéaires

Exemple 1.1 Un litre d'essence coûte 1.50. Quel est le prix de :

1. ... 2 litres d'essence ?  $y = 1.5 \cdot 2 = 3.-$

2. ... 10 litres ?  $y = 1.5 \cdot 10 = 15.-$

3. ...  $x$  litres ?  $y = 1.5 \cdot x = 1.5x$

Définition 1.1 On dit que deux variables  $x$  et  $y$  sont **proportionnelles** s'il existe  $m$  tel que  $y = m \cdot x$ .

# 1. Les fonctions linéaires

Exemple 1.1 Un litre d'essence coûte 1.50. Quel est le prix de :

1. ... 2 litres d'essence ?  $y = 1.5 \cdot 2 = 3.-$

2. ... 10 litres ?  $y = 1.5 \cdot 10 = 15.-$

3. ...  $x$  litres ?  $y = 1.5 \cdot x = 1.5x$

Définition 1.1 On dit que deux variables  $x$  et  $y$  sont **proportionnelles** s'il existe  $m$  tel que  $y = m \cdot x$ .  $m$  est le **facteur de proportion**.

# 1. Les fonctions linéaires

Exemple 1.1 Un litre d'essence coûte 1.50. Quel est le prix de :

1. ... 2 litres d'essence ?  $y = 1.5 \cdot 2 = 3.-$

2. ... 10 litres ?  $y = 1.5 \cdot 10 = 15.-$

3. ...  $x$  litres ?  $y = 1.5 \cdot x = 1.5x$

Définition 1.1 On dit que deux variables  $x$  et  $y$  sont **proportionnelles** s'il existe  $m$  tel que  $y = m \cdot x$ .  $m$  est le **facteur de proportion**.

Exemple 1.1 (suite) Que vaut le **facteur de proportion** ?

# 1. Les fonctions linéaires

Exemple 1.1 Un litre d'essence coûte 1.50. Quel est le prix de :

1. ... 2 litres d'essence ?  $y = 1.5 \cdot 2 = 3.-$

2. ... 10 litres ?  $y = 1.5 \cdot 10 = 15.-$

3. ...  $x$  litres ?  $y = 1.5 \cdot x = 1.5x$

Définition 1.1 On dit que deux variables  $x$  et  $y$  sont **proportionnelles** s'il existe  $m$  tel que  $y = m \cdot x$ .  $m$  est le **facteur de proportion**.

Exemple 1.1 (suite) Que vaut le **facteur de proportion** ?  $m=1.5$

# 1. Les fonctions linéaires

Exemple 1.1 Un litre d'essence coûte 1.50. Quel est le prix de :

1. ... 2 litres d'essence ?  $y = 1.5 \cdot 2 = 3.-$
2. ... 10 litres ?  $y = 1.5 \cdot 10 = 15.-$
3. ...  $x$  litres ?  $y = 1.5 \cdot x = 1.5x$

Définition 1.1 On dit que deux variables  $x$  et  $y$  sont **proportionnelles** s'il existe  $m$  tel que  $y = m \cdot x$ .  $m$  est le **facteur de proportion**.

Exemple 1.1 (suite) Que vaut le **facteur de proportion** ?  $m=1.5$

Définition 1.2 On représente une **relation de proportionalité** par une **fonction linéaire**

# 1. Les fonctions linéaires

Exemple 1.1 Un litre d'essence coûte 1.50. Quel est le prix de :

1. ... **2** litres d'essence ?  $y = 1.5 \cdot 2 = 3.-$
2. ... **10** litres ?  $y = 1.5 \cdot 10 = 15.-$
3. ...  **$x$**  litres ?  $y = 1.5 \cdot x = 1.5x$

Définition 1.1 On dit que deux variables  $x$  et  $y$  sont **proportionnelles** s'il existe  $m$  tel que  $y = m \cdot x$ .  $m$  est le **facteur de proportion**.

Exemple 1.1 (suite) Que vaut le **facteur de proportion** ?  $m=1.5$

Définition 1.2 On représente une **relation de proportionalité** par une **fonction linéaire** que l'on note  $f(x) = mx$ .

# 1. Les fonctions linéaires

Exemple 1.1 Un litre d'essence coûte 1.50. Quel est le prix de :

1. ... 2 litres d'essence ?  $y = 1.5 \cdot 2 = 3.-$
2. ... 10 litres ?  $y = 1.5 \cdot 10 = 15.-$
3. ...  $x$  litres ?  $y = 1.5 \cdot x = 1.5x$

Définition 1.1 On dit que deux variables  $x$  et  $y$  sont **proportionnelles** s'il existe  $m$  tel que  $y = m \cdot x$ .  $m$  est le **facteur de proportion**.

Exemple 1.1 (suite) Que vaut le **facteur de proportion** ?  $m=1.5$

Définition 1.2 On représente une **relation de proportionalité** par une **fonction linéaire** que l'on note  $f(x) = mx$ .

Exemple 1.1 (suite) Donner la fonction représentant cette relation.

# 1. Les fonctions linéaires

Exemple 1.1 Un litre d'essence coûte 1.50. Quel est le prix de :

1. ... 2 litres d'essence ?  $y = 1.5 \cdot 2 = 3.-$
2. ... 10 litres ?  $y = 1.5 \cdot 10 = 15.-$
3. ...  $x$  litres ?  $y = 1.5 \cdot x = 1.5x$

Définition 1.1 On dit que deux variables  $x$  et  $y$  sont **proportionnelles** s'il existe  $m$  tel que  $y = m \cdot x$ .  $m$  est le **facteur de proportion**.

Exemple 1.1 (suite) Que vaut le **facteur de proportion** ?  $m=1.5$

Définition 1.2 On représente une **relation de proportionalité** par une **fonction linéaire** que l'on note  $f(x) = mx$ .


Exemple 1.1 (suite) Donner la fonction représentant cette relation.  
On a  $f(x)=1.5x$



Exemple 1.1 (suite) Compléter le tableau de valeurs suivant et placer les points sur la figure. Tracer la courbe correspondant à la fonction  $f(x) = 1.5x$ .


Exemple 1.1 (suite) Compléter le tableau de valeurs suivant et placer les points sur la figure. Tracer la courbe correspondant à la fonction  $f(x) = 1.5x$ .

Litres	Prix
0	
1	
2	
3	
4	




Exemple 1.1 (suite) Compléter le tableau de valeurs suivant et placer les points sur la figure. Tracer la courbe correspondant à la fonction  $f(x) = 1.5x$ .

Litres	Prix
0	0.00
1	
2	
3	
4	




Exemple 1.1 (suite) Compléter le tableau de valeurs suivant et placer les points sur la figure. Tracer la courbe correspondant à la fonction  $f(x) = 1.5x$ .

Litres	Prix
0	0.00
1	1.50
2	
3	
4	




Exemple 1.1 (suite) Compléter le tableau de valeurs suivant et placer les points sur la figure. Tracer la courbe correspondant à la fonction  $f(x) = 1.5x$ .

Litres	Prix
0	0.00
1	1.50
2	3.00
3	
4	




Exemple 1.1 (suite) Compléter le tableau de valeurs suivant et placer les points sur la figure. Tracer la courbe correspondant à la fonction  $f(x) = 1.5x$ .

Litres	Prix
0	0.00
1	1.50
2	3.00
3	4.50
4	




Exemple 1.1 (suite) Compléter le tableau de valeurs suivant et placer les points sur la figure. Tracer la courbe correspondant à la fonction  $f(x) = 1.5x$ .

Litres	Prix
0	0.00
1	1.50
2	3.00
3	4.50
4	6.00



Exemple 1.1 (suite) Compléter le tableau de valeurs suivant et placer les points sur la figure. Tracer la courbe correspondant à la fonction  $f(x) = 1.5x$ .


Litres	Prix
0	0.00
1	1.50
2	3.00
3	4.50
4	6.00






Exemple 1.1 (suite) Compléter le tableau de valeurs suivant et placer les points sur la figure. Tracer la courbe correspondant à la fonction  $f(x) = 1.5x$ .

Litres	Prix
0	0.00
1	1.50
2	3.00
3	4.50
4	6.00




Exemple 1.1 (suite) Compléter le tableau de valeurs suivant et placer les points sur la figure. Tracer la courbe correspondant à la fonction  $f(x) = 1.5x$ .

Litres	Prix
0	0.00
1	1.50
2	3.00
3	4.50
4	6.00




Exemple 1.1 (suite) Compléter le tableau de valeurs suivant et placer les points sur la figure. Tracer la courbe correspondant à la fonction  $f(x) = 1.5x$ .

Litres	Prix
0	0.00
1	1.50
2	3.00
3	4.50
4	6.00




Exemple 1.1 (suite) Compléter le tableau de valeurs suivant et placer les points sur la figure. Tracer la courbe correspondant à la fonction  $f(x) = 1.5x$ .

Litres	Prix
0	0.00
1	1.50
2	3.00
3	4.50
4	6.00




Exemple 1.1 (suite) Compléter le tableau de valeurs suivant et placer les points sur la figure. Tracer la courbe correspondant à la fonction  $f(x) = 1.5x$ .

Litres	Prix
0	0.00
1	1.50
2	3.00
3	4.50
4	6.00




Exemple 1.1 (suite) Compléter le tableau de valeurs suivant et placer les points sur la figure. Tracer la courbe correspondant à la fonction  $f(x) = 1.5x$ .

Litres	Prix
0	0.00
1	1.50
2	3.00
3	4.50
4	6.00




Exemple 1.1 (suite) Compléter le tableau de valeurs suivant et placer les points sur la figure. Tracer la courbe correspondant à la fonction  $f(x) = 1.5x$ .

Litres	Prix
0	0.00
1	1.50
2	3.00
3	4.50
4	6.00



Exemple 1.1 (suite) Compléter le tableau de valeurs suivant et placer les points sur la figure. Tracer la courbe correspondant à la fonction  $f(x) = 1.5x$ .


Litres	Prix
0	0.00
1	1.50
2	3.00
3	4.50
4	6.00






Exemple 1.1 (suite) Compléter le tableau de valeurs suivant et placer les points sur la figure. Tracer la courbe correspondant à la fonction  $f(x) = 1.5x$ .

Litres	Prix
0	0.00
1	1.50
2	3.00
3	4.50
4	6.00




Exemple 1.1 (suite) Compléter le tableau de valeurs suivant et placer les points sur la figure. Tracer la courbe correspondant à la fonction  $f(x) = 1.5x$ .

Litres	Prix
0	0.00
1	1.50
2	3.00
3	4.50
4	6.00




Exemple 1.1 (suite) Compléter le tableau de valeurs suivant et placer les points sur la figure. Tracer la courbe correspondant à la fonction  $f(x) = 1.5x$ .

Litres	Prix
0	0.00
1	1.50
2	3.00
3	4.50
4	6.00




Exemple 1.1 (suite) Compléter le tableau de valeurs suivant et placer les points sur la figure. Tracer la courbe correspondant à la fonction  $f(x) = 1.5x$ .

Litres	Prix
0	0.00
1	1.50
2	3.00
3	4.50
4	6.00




Exemple 1.1 (suite) Compléter le tableau de valeurs suivant et placer les points sur la figure. Tracer la courbe correspondant à la fonction  $f(x) = 1.5x$ .

Litres	Prix
0	0.00
1	1.50
2	3.00
3	4.50
4	6.00




Exemple 1.1 (suite) Compléter le tableau de valeurs suivant et placer les points sur la figure. Tracer la courbe correspondant à la fonction  $f(x) = 1.5x$ .

Litres	Prix
0	0.00
1	1.50
2	3.00
3	4.50
4	6.00




Exemple 1.1 (suite) Compléter le tableau de valeurs suivant et placer les points sur la figure. Tracer la courbe correspondant à la fonction  $f(x) = 1.5x$ .

Litres	Prix
0	0.00
1	1.50
2	3.00
3	4.50
4	6.00



Exemple 1.1 (suite) Compléter le tableau de valeurs suivant et placer les points sur la figure. Tracer la courbe correspondant à la fonction  $f(x) = 1.5x$ .


Litres	Prix
0	0.00
1	1.50
2	3.00
3	4.50
4	6.00






Exemple 1.1 (suite) Compléter le tableau de valeurs suivant et placer les points sur la figure. Tracer la courbe correspondant à la fonction  $f(x) = 1.5x$ .

Litres	Prix
0	0.00
1	1.50
2	3.00
3	4.50
4	6.00




Exemple 1.1 (suite) Compléter le tableau de valeurs suivant et placer les points sur la figure. Tracer la courbe correspondant à la fonction  $f(x) = 1.5x$ .

Litres	Prix
0	0.00
1	1.50
2	3.00
3	4.50
4	6.00




Exemple 1.1 (suite) Compléter le tableau de valeurs suivant et placer les points sur la figure. Tracer la courbe correspondant à la fonction  $f(x) = 1.5x$ .

Litres	Prix
0	0.00
1	1.50
2	3.00
3	4.50
4	6.00




Exemple 1.1 (suite) Compléter le tableau de valeurs suivant et placer les points sur la figure. Tracer la courbe correspondant à la fonction  $f(x) = 1.5x$ .

Litres	Prix
0	0.00
1	1.50
2	3.00
3	4.50
4	6.00



Exemple 1.1 (suite) Compléter le tableau de valeurs suivant et placer les points sur la figure. Tracer la courbe correspondant à la fonction  $f(x) = 1.5x$ .

Litres	Prix
0	0.00
1	1.50
2	3.00
3	4.50
4	6.00




Définition 1.3 La courbe représentant une fonction affine  $f(x) = mx$  est une droite  $y = mx$  passant par l'origine  $(0, 0)$ .

Définition 1.3 La courbe représentant une fonction affine  $f(x) = mx$  est une droite  $y = mx$  passant par l'origine  $(0, 0)$ . Le facteur de proportion  $m$  représente la pente de la droite.

Définition 1.3 La courbe représentant une fonction affine  $f(x) = mx$  est une droite  $y = mx$  passant par l'origine  $(0, 0)$ . Le facteur de proportion  $m$  représente la pente de la droite.

On distingue trois cas :






Définition 1.3 La courbe représentant une fonction affine  $f(x) = mx$  est une droite  $y = mx$  passant par l'origine  $(0, 0)$ . Le facteur de proportion  $m$  représente la pente de la droite.

On distingue trois cas :


$$m > 0$$



Définition 1.3 La courbe représentant une fonction affine  $f(x) = mx$  est une droite  $y = mx$  passant par l'origine  $(0, 0)$ . Le facteur de proportion  $m$  représente la pente de la droite.

On distingue trois cas :


$$m > 0$$



Définition 1.3 La courbe représentant une fonction affine  $f(x) = mx$  est une droite  $y = mx$  passant par l'origine  $(0, 0)$ . Le facteur de proportion  $m$  représente la pente de la droite.

On distingue trois cas :

$$m > 0$$




La droite "monte"

Définition 1.3 La courbe représentant une fonction affine  $f(x) = mx$  est une droite  $y = mx$  passant par l'origine  $(0, 0)$ . Le facteur de proportion  $m$  représente la pente de la droite.


On distingue trois cas :

$$m > 0$$




La droite "monte"

$$m = 0$$



Définition 1.3 La courbe représentant une fonction affine  $f(x) = mx$  est une droite  $y = mx$  passant par l'origine  $(0, 0)$ . Le facteur de proportion  $m$  représente la pente de la droite.

On distingue trois cas :




La droite "monte"

Définition 1.3 La courbe représentant une fonction affine  $f(x) = mx$  est une droite  $y = mx$  passant par l'origine  $(0, 0)$ . Le facteur de proportion  $m$  représente la pente de la droite.


On distingue trois cas :

$$m > 0$$




La droite "monte"

$$m = 0$$




La droite est "plate"



Définition 1.3 La courbe représentant une fonction affine  $f(x) = mx$  est une droite  $y = mx$  passant par l'origine  $(0, 0)$ . Le facteur de proportion  $m$  représente la pente de la droite.


On distingue trois cas :

$$m > 0$$




La droite "monte"

$$m = 0$$



La droite est "plate"


$$m < 0$$



Définition 1.3 La courbe représentant une fonction affine  $f(x) = mx$  est une droite  $y = mx$  passant par l'origine  $(0, 0)$ . Le facteur de proportion  $m$  représente la pente de la droite.


On distingue trois cas :

$$m > 0$$




La droite "monte"

$$m = 0$$



La droite est "plate"

$$m < 0$$






Définition 1.3 La courbe représentant une fonction affine  $f(x) = mx$  est une droite  $y = mx$  passant par l'origine  $(0, 0)$ . Le facteur de proportion  $m$  représente la pente de la droite.


On distingue trois cas :

$$m > 0$$




La droite "monte"

$$m = 0$$





La droite est "plate"


$$m < 0$$





La droite "descend"



















La pente  $m$  influence l'orientation de la droite.






La pente  $m$  influence l'**orientation** de la droite. Plus la pente est grande en valeur absolue, plus la droite est "raide".

Exercice 1.1 Associer les fonctions linéaires données avec les droites correspondantes :




- (1)  $f(x) = 0$
- (2)  $f(x) = -x$
- (3)  $f(x) = \frac{1}{2}x$
- (4)  $f(x) = 2x$
- (5)  $f(x) = x$
- (6)  $f(x) = -2x$

Exercice 1.1 Associer les fonctions linéaires données avec les droites correspondantes :




- (1)  $f(x) = 0$  **d**
- (2)  $f(x) = -x$
- (3)  $f(x) = \frac{1}{2}x$
- (4)  $f(x) = 2x$
- (5)  $f(x) = x$
- (6)  $f(x) = -2x$

Exercice 1.1 Associer les fonctions linéaires données avec les droites correspondantes :




- (1)  $f(x) = 0$  **d**
- (2)  $f(x) = -x$
- (3)  $f(x) = \frac{1}{2}x$
- (4)  $f(x) = 2x$  **a**
- (5)  $f(x) = x$
- (6)  $f(x) = -2x$

Exercice 1.1 Associer les fonctions linéaires données avec les droites correspondantes :




- (1)  $f(x) = 0$  **d**
- (2)  $f(x) = -x$
- (3)  $f(x) = \frac{1}{2}x$
- (4)  $f(x) = 2x$  **a**
- (5)  $f(x) = x$  **b**
- (6)  $f(x) = -2x$

Exercice 1.1 Associer les fonctions linéaires données avec les droites correspondantes :




- (1)  $f(x) = 0$  **d**
- (2)  $f(x) = -x$
- (3)  $f(x) = \frac{1}{2}x$  **c**
- (4)  $f(x) = 2x$  **a**
- (5)  $f(x) = x$  **b**
- (6)  $f(x) = -2x$

Exercice 1.1 Associer les fonctions linéaires données avec les droites correspondantes :



- (1)  $f(x) = 0$  **d**
- (2)  $f(x) = -x$
- (3)  $f(x) = \frac{1}{2}x$  **c**
- (4)  $f(x) = 2x$  **a**
- (5)  $f(x) = x$  **b**
- (6)  $f(x) = -2x$  **f**

Exercice 1.1 Associer les fonctions linéaires données avec les droites correspondantes :



- (1)  $f(x) = 0$  d
- (2)  $f(x) = -x$  e
- (3)  $f(x) = \frac{1}{2}x$  c
- (4)  $f(x) = 2x$  a
- (5)  $f(x) = x$  b
- (6)  $f(x) = -2x$  f



## 2. Fonction affines

Exemple 2.1 Un station d'essence propose un système d'abonnement. Pour 50.- par année, le prix de l'essence passe de 1.50 à 1.40. Si l'on prend l'abonnement, combien coûtera en tout (abonnement compris) ...

1. ...0 litre d'essence ?

## 2. Fonction affines

Exemple 2.1 Un station d'essence propose un système d'abonnement. Pour 50.- par année, le prix de l'essence passe de 1.50 à 1.40. Si l'on prend l'abonnement, combien coûtera en tout (abonnement compris) ...

1. ... 0 litre d'essence ? 50.-

## 2. Fonction affines

Exemple 2.1 Un station d'essence propose un système d'abonnement. Pour 50.- par année, le prix de l'essence passe de 1.50 à 1.40. Si l'on prend l'abonnement, combien coûtera en tout (abonnement compris) ...

1. ... 0 litre d'essence ? 50.-
2. ... 10 litres d'essence ?

## 2. Fonction affines

Exemple 2.1 Un station d'essence propose un système d'abonnement. Pour 50.- par année, le prix de l'essence passe de 1.50 à 1.40. Si l'on prend l'abonnement, combien coûtera en tout (abonnement compris) ...

1. ... 0 litre d'essence ? 50.-
2. ... 10 litres d'essence ?  $1.40 \cdot 10 + 50$

## 2. Fonction affines

Exemple 2.1 Un station d'essence propose un système d'abonnement. Pour 50.- par année, le prix de l'essence passe de 1.50 à 1.40. Si l'on prend l'abonnement, combien coûtera en tout (abonnement compris) ...

1. ... 0 litre d'essence ? 50.-
2. ... 10 litres d'essence ?  $1.40 \cdot 10 + 50 = 14 + 50 = 64.$  –

## 2. Fonction affines

Exemple 2.1 Une station d'essence propose un système d'abonnement. Pour 50.- par année, le prix de l'essence passe de 1.50 à 1.40. Si l'on prend l'abonnement, combien coûtera en tout (abonnement compris) ...

1. ... 0 litre d'essence ? 50.-
2. ... 10 litres d'essence ?  $1.40 \cdot 10 + 50 = 14 + 50 = 64$ . –
3. ... 50 litres d'essence ?

## 2. Fonction affines

Exemple 2.1 Un station d'essence propose un système d'abonnement. Pour 50.- par année, le prix de l'essence passe de 1.50 à 1.40. Si l'on prend l'abonnement, combien coûtera en tout (abonnement compris) ...

1. ... 0 litre d'essence ? 50.-
2. ... 10 litres d'essence ?  $1.40 \cdot 10 + 50 = 14 + 50 = 64$ . –
3. ... 50 litres d'essence ?  $1.40 \cdot 50 + 50$

## 2. Fonction affines

Exemple 2.1 Une station d'essence propose un système d'abonnement. Pour 50.- par année, le prix de l'essence passe de 1.50 à 1.40. Si l'on prend l'abonnement, combien coûtera en tout (abonnement compris) ...

1. ... 0 litre d'essence ? 50.-
2. ... 10 litres d'essence ?  $1.40 \cdot 10 + 50 = 14 + 50 = 64.$  –
3. ... 50 litres d'essence ?  $1.40 \cdot 50 + 50 = 70 + 50 = 120.$  –



## 2. Fonction affines

Exemple 2.1 Un station d'essence propose un système d'abonnement. Pour 50.- par année, le prix de l'essence passe de 1.50 à 1.40. Si l'on prend l'abonnement, combien coûtera en tout (abonnement compris) ...

1. ... 0 litre d'essence ? 50.-
2. ... 10 litres d'essence ?  $1.40 \cdot 10 + 50 = 14 + 50 = 64$ . –
3. ... 50 litres d'essence ?  $1.40 \cdot 50 + 50 = 70 + 50 = 120$ . –
4. ...  $x$  litres d'essences ?

## 2. Fonction affines

Exemple 2.1 Une station d'essence propose un système d'abonnement. Pour 50.- par année, le prix de l'essence passe de 1.50 à 1.40. Si l'on prend l'abonnement, combien coûtera en tout (abonnement compris) ...

1. ... 0 litre d'essence ? 50.-
2. ... 10 litres d'essence ?  $1.40 \cdot 10 + 50 = 14 + 50 = 64$ . –
3. ... 50 litres d'essence ?  $1.40 \cdot 50 + 50 = 70 + 50 = 120$ . –
4. ...  $x$  litres d'essences ?  $1.40 \cdot x + 50$

## 2. Fonction affines

Exemple 2.1 Un station d'essence propose un système d'abonnement. Pour 50.- par année, le prix de l'essence passe de 1.50 à 1.40. Si l'on prend l'abonnement, combien coûtera en tout (abonnement compris) ...

1. ... 0 litre d'essence ? 50.-
2. ... 10 litres d'essence ?  $1.40 \cdot 10 + 50 = 14 + 50 = 64$ . –
3. ... 50 litres d'essence ?  $1.40 \cdot 50 + 50 = 70 + 50 = 120$ . –
4. ...  $x$  litres d'essences ?  $1.40 \cdot x + 50 = 1.4x + 50$

## 2. Fonction affines

Exemple 2.1 Un station d'essence propose un système d'abonnement. Pour 50.- par année, le prix de l'essence passe de 1.50 à 1.40. Si l'on prend l'abonnement, combien coûtera en tout (abonnement compris) ...

1. ... 0 litre d'essence ? 50.-
2. ... 10 litres d'essence ?  $1.40 \cdot 10 + 50 = 14 + 50 = 64$ . –
3. ... 50 litres d'essence ?  $1.40 \cdot 50 + 50 = 70 + 50 = 120$ . –
4. ...  $x$  litres d'essences ?  $1.40 \cdot x + 50 = 1.4x + 50$

Définition 2.1 On appelle **fonctions affines** les relations du type

$$f(x) = mx + h.$$

## 2. Fonction affines

Exemple 2.1 Un station d'essence propose un système d'abonnement. Pour 50.- par année, le prix de l'essence passe de 1.50 à 1.40. Si l'on prend l'abonnement, combien coûtera en tout (abonnement compris) ...

1. ...0 litre d'essence ? 50.-
2. ...10 litres d'essence ?  $1.40 \cdot 10 + 50 = 14 + 50 = 64$ . –
3. ...50 litres d'essence ?  $1.40 \cdot 50 + 50 = 70 + 50 = 120$ . –
4. ... $x$  litres d'essences ?  $1.40 \cdot x + 50 = 1.4x + 50$

Définition 2.1 On appelle **fonctions affines** les relations du type

$$f(x) = mx + h.$$

Ces fonctions sont représentées par des droites  $y = mx + h$  de **pente  $m$**  et passant par le point  $(0, h)$ .

## 2. Fonction affines

Exemple 2.1 Un station d'essence propose un système d'abonnement. Pour 50.- par année, le prix de l'essence passe de 1.50 à 1.40. Si l'on prend l'abonnement, combien coûtera en tout (abonnement compris) ...

1. ... 0 litre d'essence ?  $50.-$
2. ... 10 litres d'essence ?  $1.40 \cdot 10 + 50 = 14 + 50 = 64.-$
3. ... 50 litres d'essence ?  $1.40 \cdot 50 + 50 = 70 + 50 = 120.-$
4. ...  $x$  litres d'essences ?  $1.40 \cdot x + 50 = 1.4x + 50$

Définition 2.1 On appelle **fonctions affines** les relations du type

$$f(x) = mx + h.$$

Ces fonctions sont représentées par des droites  $y = mx + h$  de **pente  $m$**  et passant par le point  $(0, h)$ .  $h$  est l'**ordonnée à l'origine**.

## 2. Fonction affines

Exemple 2.1 Un station d'essence propose un système d'abonnement. Pour 50.- par année, le prix de l'essence passe de 1.50 à 1.40. Si l'on prend l'abonnement, combien coûtera en tout (abonnement compris) ...

1. ... 0 litre d'essence ?  $50.-$
2. ... 10 litres d'essence ?  $1.40 \cdot 10 + 50 = 14 + 50 = 64.-$
3. ... 50 litres d'essence ?  $1.40 \cdot 50 + 50 = 70 + 50 = 120.-$
4. ...  $x$  litres d'essences ?  $1.40 \cdot x + 50 = 1.4x + 50$

Définition 2.1 On appelle **fonctions affines** les relations du type

$$f(x) = mx + h.$$

Ces fonctions sont représentées par des droites  $y = mx + h$  de **pente  $m$**  et passant par le point  $(0, h)$ .  $h$  est l'**ordonnée à l'origine**. Si  $h = 0$ , la fonction est linéaire.

Exemple 2.1 (suite) Dans la fonction  $f(x) = 1.4x + 50$ ,

1. que vaut la pente de la droite correspondante ?



Exemple 2.1 (suite) Dans la fonction  $f(x) = 1.4x + 50$ ,

1. que vaut la pente de la droite correspondante?  $m = 1.4$

Exemple 2.1 (suite) Dans la fonction  $f(x) = 1.4x + 50$ ,

1. que vaut la pente de la droite correspondante?  $m = 1.4$
2. que vaut l'ordonnée à l'origine?


Exemple 2.1 (suite) Dans la fonction  $f(x) = 1.4x + 50$ ,

1. que vaut la pente de la droite correspondante?  $m = 1.4$
2. que vaut l'ordonnée à l'origine?  $h = 50$

Exemple 2.1 (suite) Dans la fonction  $f(x) = 1.4x + 50$ ,

1. que vaut la pente de la droite correspondante?  $m = 1.4$
2. que vaut l'ordonnée à l'origine?  $h = 50$


Représenter la droite correspondante sur la figure ci-dessous.



Exemple 2.1 (suite) Dans la fonction  $f(x) = 1.4x + 50$ ,

1. que vaut la pente de la droite correspondante?  $m = 1.4$
2. que vaut l'ordonnée à l'origine?  $h = 50$


Représenter la droite correspondante sur la figure ci-dessous.



Exemple 2.1 (suite) Dans la fonction  $f(x) = 1.4x + 50$ ,

1. que vaut la pente de la droite correspondante?  $m = 1.4$
2. que vaut l'ordonnée à l'origine?  $h = 50$


Représenter la droite correspondante sur la figure ci-dessous.



Exemple 2.1 (suite) Dans la fonction  $f(x) = 1.4x + 50$ ,

1. que vaut la pente de la droite correspondante?  $m = 1.4$
2. que vaut l'ordonnée à l'origine?  $h = 50$


Représenter la droite correspondante sur la figure ci-dessous.



Exemple 2.1 (suite) Dans la fonction  $f(x) = 1.4x + 50$ ,

1. que vaut la pente de la droite correspondante?  $m = 1.4$
2. que vaut l'ordonnée à l'origine?  $h = 50$

Représenter la droite correspondante sur la figure ci-dessous.






Exemple 2.1 (suite) Dans la fonction  $f(x) = 1.4x + 50$ ,

1. que vaut la pente de la droite correspondante?  $m = 1.4$
2. que vaut l'ordonnée à l'origine?  $h = 50$


Représenter la droite correspondante sur la figure ci-dessous.



Exemple 2.1 (suite) Dans la fonction  $f(x) = 1.4x + 50$ ,

1. que vaut la pente de la droite correspondante?  $m = 1.4$
2. que vaut l'ordonnée à l'origine?  $h = 50$


Représenter la droite correspondante sur la figure ci-dessous.



Exemple 2.1 (suite) Dans la fonction  $f(x) = 1.4x + 50$ ,

1. que vaut la pente de la droite correspondante?  $m = 1.4$
2. que vaut l'ordonnée à l'origine?  $h = 50$


Représenter la droite correspondante sur la figure ci-dessous.



Exemple 2.1 (suite) Dans la fonction  $f(x) = 1.4x + 50$ ,

1. que vaut la pente de la droite correspondante?  $m = 1.4$
2. que vaut l'ordonnée à l'origine?  $h = 50$


Représenter la droite correspondante sur la figure ci-dessous.



Exemple 2.1 (suite) Dans la fonction  $f(x) = 1.4x + 50$ ,

1. que vaut la pente de la droite correspondante?  $m = 1.4$
2. que vaut l'ordonnée à l'origine?  $h = 50$


Représenter la droite correspondante sur la figure ci-dessous.



Exemple 2.1 (suite) Dans la fonction  $f(x) = 1.4x + 50$ ,

1. que vaut la pente de la droite correspondante?  $m = 1.4$
2. que vaut l'ordonnée à l'origine?  $h = 50$


Représenter la droite correspondante sur la figure ci-dessous.



Exemple 2.1 (suite) Dans la fonction  $f(x) = 1.4x + 50$ ,

1. que vaut la pente de la droite correspondante?  $m = 1.4$
2. que vaut l'ordonnée à l'origine?  $h = 50$


Représenter la droite correspondante sur la figure ci-dessous.



Exemple 2.1 (suite) Dans la fonction  $f(x) = 1.4x + 50$ ,

1. que vaut la pente de la droite correspondante?  $m = 1.4$
2. que vaut l'ordonnée à l'origine?  $h = 50$

Représenter la droite correspondante sur la figure ci-dessous.





Exercice 2.1 Soit  $f(x) = 2x - 1$  une fonction affine. Que vaut :

1.  $f(2)$ ?

Exercice 2.1 Soit  $f(x) = 2x - 1$  une fonction affine. Que vaut :

1.  $f(2)$ ?  $f(2) = 2 \cdot 2 - 1$

Exercice 2.1 Soit  $f(x) = 2x - 1$  une fonction affine. Que vaut :

1.  $f(2)$ ?  $f(2) = 2 \cdot 2 - 1 = 4 - 1 = 3$

Exercice 2.1 Soit  $f(x) = 2x - 1$  une fonction affine. Que vaut :

1.  $f(2)$ ?  $f(2) = 2 \cdot 2 - 1 = 4 - 1 = 3$

2.  $f(0)$ ?

Exercice 2.1 Soit  $f(x) = 2x - 1$  une fonction affine. Que vaut :

1.  $f(2)$ ?  $f(2) = 2 \cdot 2 - 1 = 4 - 1 = 3$

2.  $f(0)$ ?  $f(0) = 2 \cdot 0 - 1$

Exercice 2.1 Soit  $f(x) = 2x - 1$  une fonction affine. Que vaut :

1.  $f(2)$ ?  $f(2) = 2 \cdot 2 - 1 = 4 - 1 = 3$

2.  $f(0)$ ?  $f(0) = 2 \cdot 0 - 1 = -1$

Exercice 2.1 Soit  $f(x) = 2x - 1$  une fonction affine. Que vaut :

1.  $f(2)$ ?  $f(2) = 2 \cdot 2 - 1 = 4 - 1 = 3$

2.  $f(0)$ ?  $f(0) = 2 \cdot 0 - 1 = -1$

3.  $f(-3)$ ?

Exercice 2.1 Soit  $f(x) = 2x - 1$  une fonction affine. Que vaut :

1.  $f(2)$ ?  $f(2) = 2 \cdot 2 - 1 = 4 - 1 = 3$

2.  $f(0)$ ?  $f(0) = 2 \cdot 0 - 1 = -1$

3.  $f(-3)$ ?  $f(-3) = 2 \cdot (-3) - 1$



Exercice 2.1 Soit  $f(x) = 2x - 1$  une fonction affine. Que vaut :

1.  $f(2)$ ?  $f(2) = 2 \cdot 2 - 1 = 4 - 1 = 3$

2.  $f(0)$ ?  $f(0) = 2 \cdot 0 - 1 = -1$

3.  $f(-3)$ ?  $f(-3) = 2 \cdot (-3) - 1 = -6 - 1 = -7$


Exercice 2.1 Soit  $f(x) = 2x - 1$  une fonction affine. Que vaut :

1.  $f(2)$ ?  $f(2) = 2 \cdot 2 - 1 = 4 - 1 = 3$

2.  $f(0)$ ?  $f(0) = 2 \cdot 0 - 1 = -1$

3.  $f(-3)$ ?  $f(-3) = 2 \cdot (-3) - 1 = -6 - 1 = -7$

et esquisser la droite associée.




Exercice 2.1 Soit  $f(x) = 2x - 1$  une fonction affine. Que vaut :

1.  $f(2)$ ?  $f(2) = 2 \cdot 2 - 1 = 4 - 1 = 3 \rightarrow (2, 3)$

2.  $f(0)$ ?  $f(0) = 2 \cdot 0 - 1 = -1$

3.  $f(-3)$ ?  $f(-3) = 2 \cdot (-3) - 1 = -6 - 1 = -7$

et esquisser la droite associée.




Exercice 2.1 Soit  $f(x) = 2x - 1$  une fonction affine. Que vaut :

1.  $f(2)$ ?  $f(2) = 2 \cdot 2 - 1 = 4 - 1 = 3 \rightarrow (2, 3)$

2.  $f(0)$ ?  $f(0) = 2 \cdot 0 - 1 = -1 \rightarrow (0, -1)$

3.  $f(-3)$ ?  $f(-3) = 2 \cdot (-3) - 1 = -6 - 1 = -7$

et esquisser la droite associée.




Exercice 2.1 Soit  $f(x) = 2x - 1$  une fonction affine. Que vaut :

1.  $f(2)$ ?  $f(2) = 2 \cdot 2 - 1 = 4 - 1 = 3 \rightarrow (2, 3)$

2.  $f(0)$ ?  $f(0) = 2 \cdot 0 - 1 = -1 \rightarrow (0, -1)$

3.  $f(-3)$ ?  $f(-3) = 2 \cdot (-3) - 1 = -6 - 1 = -7 \rightarrow (-3, -7)$

et esquisser la droite associée.




Exercice 2.1 Soit  $f(x) = 2x - 1$  une fonction affine. Que vaut :

1.  $f(2)$ ?  $f(2) = 2 \cdot 2 - 1 = 4 - 1 = 3 \rightarrow (2, 3)$

2.  $f(0)$ ?  $f(0) = 2 \cdot 0 - 1 = -1 \rightarrow (0, -1)$

3.  $f(-3)$ ?  $f(-3) = 2 \cdot (-3) - 1 = -6 - 1 = -7 \rightarrow (-3, -7)$

et esquisser la droite associée.




Exercice 2.1 Soit  $f(x) = 2x - 1$  une fonction affine. Que vaut :

1.  $f(2)$ ?  $f(2) = 2 \cdot 2 - 1 = 4 - 1 = 3 \rightarrow (2, 3)$

2.  $f(0)$ ?  $f(0) = 2 \cdot 0 - 1 = -1 \rightarrow (0, -1)$

3.  $f(-3)$ ?  $f(-3) = 2 \cdot (-3) - 1 = -6 - 1 = -7 \rightarrow (-3, -7)$

et esquisser la droite associée.




Exercice 2.1 Soit  $f(x) = 2x - 1$  une fonction affine. Que vaut :

1.  $f(2)$ ?  $f(2) = 2 \cdot 2 - 1 = 4 - 1 = 3 \rightarrow (2, 3)$

2.  $f(0)$ ?  $f(0) = 2 \cdot 0 - 1 = -1 \rightarrow (0, -1)$

3.  $f(-3)$ ?  $f(-3) = 2 \cdot (-3) - 1 = -6 - 1 = -7 \rightarrow (-3, -7)$

et esquisser la droite associée.






Exercice 2.1 Soit  $f(x) = 2x - 1$  une fonction affine. Que vaut :

1.  $f(2)$ ?  $f(2) = 2 \cdot 2 - 1 = 4 - 1 = 3 \rightarrow (2, 3)$

2.  $f(0)$ ?  $f(0) = 2 \cdot 0 - 1 = -1 \rightarrow (0, -1)$

3.  $f(-3)$ ?  $f(-3) = 2 \cdot (-3) - 1 = -6 - 1 = -7 \rightarrow (-3, -7)$

et esquisser la droite associée.




Exercice 2.1 Soit  $f(x) = 2x - 1$  une fonction affine. Que vaut :

1.  $f(2)$ ?  $f(2) = 2 \cdot 2 - 1 = 4 - 1 = 3 \rightarrow (2, 3)$

2.  $f(0)$ ?  $f(0) = 2 \cdot 0 - 1 = -1 \rightarrow (0, -1)$

3.  $f(-3)$ ?  $f(-3) = 2 \cdot (-3) - 1 = -6 - 1 = -7 \rightarrow (-3, -7)$

et esquisser la droite associée.




Exercice 2.1 Soit  $f(x) = 2x - 1$  une fonction affine. Que vaut :

1.  $f(2)$ ?  $f(2) = 2 \cdot 2 - 1 = 4 - 1 = 3 \rightarrow (2, 3)$

2.  $f(0)$ ?  $f(0) = 2 \cdot 0 - 1 = -1 \rightarrow (0, -1)$

3.  $f(-3)$ ?  $f(-3) = 2 \cdot (-3) - 1 = -6 - 1 = -7 \rightarrow (-3, -7)$

et esquisser la droite associée.




Exercice 2.1 Soit  $f(x) = 2x - 1$  une fonction affine. Que vaut :

1.  $f(2)$ ?  $f(2) = 2 \cdot 2 - 1 = 4 - 1 = 3 \rightarrow (2, 3)$

2.  $f(0)$ ?  $f(0) = 2 \cdot 0 - 1 = -1 \rightarrow (0, -1)$

3.  $f(-3)$ ?  $f(-3) = 2 \cdot (-3) - 1 = -6 - 1 = -7 \rightarrow (-3, -7)$

et esquisser la droite associée.




Exercice 2.1 Soit  $f(x) = 2x - 1$  une fonction affine. Que vaut :

1.  $f(2)$ ?  $f(2) = 2 \cdot 2 - 1 = 4 - 1 = 3 \rightarrow (2, 3)$

2.  $f(0)$ ?  $f(0) = 2 \cdot 0 - 1 = -1 \rightarrow (0, -1)$

3.  $f(-3)$ ?  $f(-3) = 2 \cdot (-3) - 1 = -6 - 1 = -7 \rightarrow (-3, -7)$

et esquisser la droite associée.




Exercice 2.1 Soit  $f(x) = 2x - 1$  une fonction affine. Que vaut :

1.  $f(2)$ ?  $f(2) = 2 \cdot 2 - 1 = 4 - 1 = 3 \rightarrow (2, 3)$

2.  $f(0)$ ?  $f(0) = 2 \cdot 0 - 1 = -1 \rightarrow (0, -1)$

3.  $f(-3)$ ?  $f(-3) = 2 \cdot (-3) - 1 = -6 - 1 = -7 \rightarrow (-3, -7)$

et esquisser la droite associée.




Exercice 2.1 Soit  $f(x) = 2x - 1$  une fonction affine. Que vaut :

1.  $f(2)$ ?  $f(2) = 2 \cdot 2 - 1 = 4 - 1 = 3 \rightarrow (2, 3)$

2.  $f(0)$ ?  $f(0) = 2 \cdot 0 - 1 = -1 \rightarrow (0, -1)$

3.  $f(-3)$ ?  $f(-3) = 2 \cdot (-3) - 1 = -6 - 1 = -7 \rightarrow (-3, -7)$

et esquisser la droite associée.




Exercice 2.1 Soit  $f(x) = 2x - 1$  une fonction affine. Que vaut :

1.  $f(2)$ ?  $f(2) = 2 \cdot 2 - 1 = 4 - 1 = 3 \rightarrow (2, 3)$

2.  $f(0)$ ?  $f(0) = 2 \cdot 0 - 1 = -1 \rightarrow (0, -1)$

3.  $f(-3)$ ?  $f(-3) = 2 \cdot (-3) - 1 = -6 - 1 = -7 \rightarrow (-3, -7)$

et esquisser la droite associée.






Exercice 2.1 Soit  $f(x) = 2x - 1$  une fonction affine. Que vaut :

1.  $f(2)$ ?  $f(2) = 2 \cdot 2 - 1 = 4 - 1 = 3 \rightarrow (2, 3)$

2.  $f(0)$ ?  $f(0) = 2 \cdot 0 - 1 = -1 \rightarrow (0, -1)$

3.  $f(-3)$ ?  $f(-3) = 2 \cdot (-3) - 1 = -6 - 1 = -7 \rightarrow (-3, -7)$

et esquisser la droite associée.




Exercice 2.1 Soit  $f(x) = 2x - 1$  une fonction affine. Que vaut :

1.  $f(2)$ ?  $f(2) = 2 \cdot 2 - 1 = 4 - 1 = 3 \rightarrow (2, 3)$

2.  $f(0)$ ?  $f(0) = 2 \cdot 0 - 1 = -1 \rightarrow (0, -1)$

3.  $f(-3)$ ?  $f(-3) = 2 \cdot (-3) - 1 = -6 - 1 = -7 \rightarrow (-3, -7)$

et esquisser la droite associée.




Exercice 2.1 Soit  $f(x) = 2x - 1$  une fonction affine. Que vaut :

1.  $f(2)$ ?  $f(2) = 2 \cdot 2 - 1 = 4 - 1 = 3 \rightarrow (2, 3)$

2.  $f(0)$ ?  $f(0) = 2 \cdot 0 - 1 = -1 \rightarrow (0, -1)$

3.  $f(-3)$ ?  $f(-3) = 2 \cdot (-3) - 1 = -6 - 1 = -7 \rightarrow (-3, -7)$

et esquisser la droite associée.




Exercice 2.1 Soit  $f(x) = 2x - 1$  une fonction affine. Que vaut :

1.  $f(2)$ ?  $f(2) = 2 \cdot 2 - 1 = 4 - 1 = 3 \rightarrow (2, 3)$

2.  $f(0)$ ?  $f(0) = 2 \cdot 0 - 1 = -1 \rightarrow (0, -1)$

3.  $f(-3)$ ?  $f(-3) = 2 \cdot (-3) - 1 = -6 - 1 = -7 \rightarrow (-3, -7)$

et esquisser la droite associée.




Exercice 2.1 Soit  $f(x) = 2x - 1$  une fonction affine. Que vaut :

1.  $f(2)$ ?  $f(2) = 2 \cdot 2 - 1 = 4 - 1 = 3 \rightarrow (2, 3)$

2.  $f(0)$ ?  $f(0) = 2 \cdot 0 - 1 = -1 \rightarrow (0, -1)$


3.  $f(-3)$ ?  $f(-3) = 2 \cdot (-3) - 1 = -6 - 1 = -7 \rightarrow (-3, -7)$

et esquisser la droite associée.




### 3. Interprétation graphique

Exemple 3.1 Soit la fonction  $f(x) = 2x + 1$ . Représenter graphiquement la pente et l'ordonnée à l'origine.




### 3. Interprétation graphique

Exemple 3.1 Soit la fonction  $f(x) = 2x + 1$ . Représenter graphiquement la pente et l'ordonnée à l'origine.



### 3. Interprétation graphique


Exemple 3.1 Soit la fonction  $f(x) = 2x+1$ . Représenter graphiquement la pente et l'ordonnée à l'origine.






### 3. Interprétation graphique

Exemple 3.1 Soit la fonction  $f(x) = 2x + 1$ . Représenter graphiquement la pente et l'ordonnée à l'origine.




### 3. Interprétation graphique

Exemple 3.1 Soit la fonction  $f(x) = 2x + 1$ . Représenter graphiquement la pente et l'ordonnée à l'origine.




### 3. Interprétation graphique

Exemple 3.1 Soit la fonction  $f(x) = 2x+1$ . Représenter graphiquement la pente et l'ordonnée à l'origine.




### 3. Interprétation graphique

Exemple 3.1 Soit la fonction  $f(x) = 2x + 1$ . Représenter graphiquement la pente et l'ordonnée à l'origine.




### 3. Interprétation graphique

Exemple 3.1 Soit la fonction  $f(x) = 2x + 1$ . Représenter graphiquement la pente et l'ordonnée à l'origine.



### 3. Interprétation graphique


Exemple 3.1 Soit la fonction  $f(x) = 2x + 1$ . Représenter graphiquement la pente et l'ordonnée à l'origine.



L'**ordonnée à l'origine** est donnée par  $f(0)$ , c'est la "hauteur" à laquelle la droite coupe l'axe de  $y$ .

Exemple 3.2 Dessiner la droite associée aux fonctions suivantes


1.  $f(x) = \frac{1}{2}x - 1$



Exemple 3.2 Dessiner la droite associée aux fonctions suivantes

1.  $f(x) = \frac{1}{2}x - 1$

$m =$  ,  $h =$






Exemple 3.2 Dessiner la droite associée aux fonctions suivantes

1.  $f(x) = \frac{1}{2}x - 1$


$m = \frac{1}{2}$ ,  $h =$



Exemple 3.2 Dessiner la droite associée aux fonctions suivantes

1.  $f(x) = \frac{1}{2}x - 1$


$m = \frac{1}{2}, h = -1$



Exemple 3.2 Dessiner la droite associée aux fonctions suivantes

1.  $f(x) = \frac{1}{2}x - 1$


$m = \frac{1}{2}, h = -1$



Exemple 3.2 Dessiner la droite associée aux fonctions suivantes

1.  $f(x) = \frac{1}{2}x - 1$


$m = \frac{1}{2}, h = -1$



### Exemple 3.2 Dessiner la droite associée aux fonctions suivantes

1.  $f(x) = \frac{1}{2}x - 1$


$$m = \frac{1}{2}, h = -1$$



### Exemple 3.2 Dessiner la droite associée aux fonctions suivantes

1.  $f(x) = \frac{1}{2}x - 1$


$m = \frac{1}{2}, h = -1$



Exemple 3.2 Dessiner la droite associée aux fonctions suivantes

1.  $f(x) = \frac{1}{2}x - 1$


$m = \frac{1}{2}, h = -1$



### Exemple 3.2 Dessiner la droite associée aux fonctions suivantes

1.  $f(x) = \frac{1}{2}x - 1$

$$m = \frac{1}{2}, h = -1$$







Exemple 3.2 Dessiner la droite associée aux fonctions suivantes

1.  $f(x) = \frac{1}{2}x - 1$

$m = \frac{1}{2}, h = -1$




2.  $f(x) = 2$



### Exemple 3.2 Dessiner la droite associée aux fonctions suivantes


1.  $f(x) = \frac{1}{2}x - 1$

$m = \frac{1}{2}$ ,  $h = -1$



2.  $f(x) = 2$


$m =$  ,  $h =$



### Exemple 3.2 Dessiner la droite associée aux fonctions suivantes


1.  $f(x) = \frac{1}{2}x - 1$

$$m = \frac{1}{2}, h = -1$$



2.  $f(x) = 2 = 0 \cdot x + 2$


$$m = , h =$$



### Exemple 3.2 Dessiner la droite associée aux fonctions suivantes


1.  $f(x) = \frac{1}{2}x - 1$

$$m = \frac{1}{2}, h = -1$$



2.  $f(x) = 2 = 0 \cdot x + 2$


$$m = 0, h =$$



### Exemple 3.2 Dessiner la droite associée aux fonctions suivantes


1.  $f(x) = \frac{1}{2}x - 1$

$$m = \frac{1}{2}, h = -1$$



2.  $f(x) = 2 = 0 \cdot x + 2$


$$m = 0, h = 2$$



### Exemple 3.2 Dessiner la droite associée aux fonctions suivantes


1.  $f(x) = \frac{1}{2}x - 1$

$$m = \frac{1}{2}, h = -1$$



2.  $f(x) = 2 = 0 \cdot x + 2$


$$m = 0, h = 2$$



### Exemple 3.2 Dessiner la droite associée aux fonctions suivantes


1.  $f(x) = \frac{1}{2}x - 1$

$$m = \frac{1}{2}, h = -1$$



2.  $f(x) = 2 = 0 \cdot x + 2$


$$m = 0, h = 2$$



### Exemple 3.2 Dessiner la droite associée aux fonctions suivantes


1.  $f(x) = \frac{1}{2}x - 1$

$$m = \frac{1}{2}, h = -1$$



2.  $f(x) = 2 = 0 \cdot x + 2$

$$m = 0, h = 2$$






### Exemple 3.2 Dessiner la droite associée aux fonctions suivantes


1.  $f(x) = \frac{1}{2}x - 1$

$$m = \frac{1}{2}, h = -1$$



2.  $f(x) = 2 = 0 \cdot x + 2$


$$m = 0, h = 2$$



### Exemple 3.2 Dessiner la droite associée aux fonctions suivantes


1.  $f(x) = \frac{1}{2}x - 1$

$$m = \frac{1}{2}, h = -1$$




2.  $f(x) = 2 = 0 \cdot x + 2$

$$m = 0, h = 2$$




3.  $f(x) = -x + 1$




3.  $f(x) = -x + 1$

$m =$  ,  $h =$




3.  $f(x) = -x + 1$

$m = -1$ ,  $h =$



$$3. f(x) = -x + 1$$


$$m = -1, h = 1$$



3.  $f(x) = -x + 1$

$m = -1$ ,  $h = 1$


La pente est négative,  
donc la droite descend !



3.  $f(x) = -x + 1$

$m = -1, h = 1$

La pente est négative,  
donc la droite descend !






3.  $f(x) = -x + 1$

$m = -1, h = 1$


La pente est négative,  
donc la droite descend !



3.  $f(x) = -x + 1$

$m = -1, h = 1$


La pente est négative,  
donc la droite descend !



3.  $f(x) = -x + 1$

$m = -1, h = 1$


La pente est négative,  
donc la droite descend !



3.  $f(x) = -x + 1$

$m = -1, h = 1$


La pente est négative,  
donc la droite descend !



3.  $f(x) = -x + 1$

$m = -1, h = 1$


La pente est négative,  
donc la droite descend !




3.  $f(x) = -x + 1$

$m = -1, h = 1$

La pente est négative,  
donc la droite descend !




Exercice 3.1 Trouver la fonction associée à la droite ci-dessous :




3.  $f(x) = -x + 1$

$m = -1, h = 1$

La pente est négative,  
donc la droite descend !




Exercice 3.1 Trouver la fonction associée à la droite ci-dessous :




3.  $f(x) = -x + 1$

$m = -1, h = 1$

La pente est négative,  
donc la droite descend !



Exercice 3.1 Trouver la fonction associée à la droite ci-dessous :







3.  $f(x) = -x + 1$

$m = -1, h = 1$

La pente est négative,  
donc la droite descend !




Exercice 3.1 Trouver la fonction associée à la droite ci-dessous :




3.  $f(x) = -x + 1$

$m = -1, h = 1$

La pente est négative,  
donc la droite descend !



Exercice 3.1 Trouver la fonction associée à la droite ci-dessous :




Pente  $m =$


3.  $f(x) = -x + 1$

$m = -1, h = 1$

La pente est négative,  
donc la droite descend !



Exercice 3.1 Trouver la fonction associée à la droite ci-dessous :




Pente  $m = \frac{-2}{1}$


3.  $f(x) = -x + 1$

$m = -1, h = 1$

La pente est négative,  
donc la droite descend !



Exercice 3.1 Trouver la fonction associée à la droite ci-dessous :




Pente  $m = \frac{-2}{1} = -2$


3.  $f(x) = -x + 1$

$m = -1, h = 1$

La pente est négative,  
donc la droite descend !



Exercice 3.1 Trouver la fonction associée à la droite ci-dessous :



Pente  $m = \frac{-2}{1} = -2$


On a  $m = -2$  et  $h = 1$ ,  
donc

$f(x)$


3.  $f(x) = -x + 1$

$m = -1, h = 1$

La pente est négative,  
donc la droite descend !



Exercice 3.1 Trouver la fonction associée à la droite ci-dessous :



Pente  $m = \frac{-2}{1} = -2$

On a  $m = -2$  et  $h = 1$ ,  
donc

$f(x) = -2x + 1$

## 4. Calcul avec les coordonnées

Remarque 4.1 Un point  $(x; y)$  appartient à une droite s'il satisfait son équation  $y = mx + h$ .

## 4. Calcul avec les coordonnées

Remarque 4.1 Un point  $(x; y)$  appartient à une droite s'il satisfait son équation  $y = mx + h$ .

Exemple 4.1 Le point  $(5; 6)$  appartient-il à la droite  $y = 2x + 1$  ?



## 4. Calcul avec les coordonnées

Remarque 4.1 Un point  $(x; y)$  appartient à une droite s'il satisfait son équation  $y = mx + h$ .

Exemple 4.1 Le point  $(5; 6)$  appartient-il à la droite  $y = 2x + 1$  ?

$$y \stackrel{?}{=} 2x + 1$$

## 4. Calcul avec les coordonnées

Remarque 4.1 Un point  $(x; y)$  appartient à une droite s'il satisfait son équation  $y = mx + h$ .

Exemple 4.1 Le point  $(5; 6)$  appartient-il à la droite  $y = 2x + 1$  ?

$$y \stackrel{?}{=} 2x + 1 \Rightarrow 6 \stackrel{?}{=} 2 \cdot 5 + 1$$

## 4. Calcul avec les coordonnées

Remarque 4.1 Un point  $(x; y)$  appartient à une droite s'il satisfait son équation  $y = mx + h$ .

Exemple 4.1 Le point  $(5; 6)$  appartient-il à la droite  $y = 2x + 1$  ?

$$y \stackrel{?}{=} 2x + 1 \Rightarrow 6 \stackrel{?}{=} 2 \cdot 5 + 1 \Leftrightarrow 6 \stackrel{?}{=} 11$$

## 4. Calcul avec les coordonnées

Remarque 4.1 Un point  $(x; y)$  appartient à une droite s'il satisfait son équation  $y = mx + h$ .

Exemple 4.1 Le point  $(5; 6)$  appartient-il à la droite  $y = 2x + 1$  ?

$$y \stackrel{?}{=} 2x + 1 \Rightarrow 6 \stackrel{?}{=} 2 \cdot 5 + 1 \Leftrightarrow 6 \stackrel{?}{=} 11 \Rightarrow \text{Non !}$$

## 4. Calcul avec les coordonnées

Remarque 4.1 Un point  $(x; y)$  appartient à une droite s'il satisfait son équation  $y = mx + h$ .

Exemple 4.1 Le point  $(5; 6)$  appartient-il à la droite  $y = 2x + 1$ ?

$$y \stackrel{?}{=} 2x + 1 \Rightarrow 6 \stackrel{?}{=} 2 \cdot 5 + 1 \Leftrightarrow 6 \stackrel{?}{=} 11 \Rightarrow \text{Non !}$$

Exercice 4.1 Le point  $(-4; 2)$  appartient-il à la droite  $y = -2x - 6$ ?

## 4. Calcul avec les coordonnées

Remarque 4.1 Un point  $(x; y)$  appartient à une droite s'il satisfait son équation  $y = mx + h$ .

Exemple 4.1 Le point  $(5; 6)$  appartient-il à la droite  $y = 2x + 1$  ?

$$y \stackrel{?}{=} 2x + 1 \Rightarrow 6 \stackrel{?}{=} 2 \cdot 5 + 1 \Leftrightarrow 6 \stackrel{?}{=} 11 \Rightarrow \text{Non !}$$

Exercice 4.1 Le point  $(-4; 2)$  appartient-il à la droite  $y = -2x - 6$  ?

$$y \stackrel{?}{=} -2x - 6$$

## 4. Calcul avec les coordonnées

Remarque 4.1 Un point  $(x; y)$  appartient à une droite s'il satisfait son équation  $y = mx + h$ .

Exemple 4.1 Le point  $(5; 6)$  appartient-il à la droite  $y = 2x + 1$  ?

$$y \stackrel{?}{=} 2x + 1 \Rightarrow 6 \stackrel{?}{=} 2 \cdot 5 + 1 \Leftrightarrow 6 \stackrel{?}{=} 11 \Rightarrow \text{Non !}$$

Exercice 4.1 Le point  $(-4; 2)$  appartient-il à la droite  $y = -2x - 6$  ?

$$y \stackrel{?}{=} -2x - 6 \Rightarrow 2 \stackrel{?}{=} (-2) \cdot (-4) - 6$$

## 4. Calcul avec les coordonnées

Remarque 4.1 Un point  $(x; y)$  appartient à une droite s'il satisfait son équation  $y = mx + h$ .

Exemple 4.1 Le point  $(5; 6)$  appartient-il à la droite  $y = 2x + 1$  ?

$$y \stackrel{?}{=} 2x + 1 \Rightarrow 6 \stackrel{?}{=} 2 \cdot 5 + 1 \Leftrightarrow 6 \stackrel{?}{=} 11 \Rightarrow \text{Non !}$$

Exercice 4.1 Le point  $(-4; 2)$  appartient-il à la droite  $y = -2x - 6$  ?

$$y \stackrel{?}{=} -2x - 6 \Rightarrow 2 \stackrel{?}{=} (-2) \cdot (-4) - 6 \Leftrightarrow 2 \stackrel{?}{=} 2$$



## 4. Calcul avec les coordonnées

Remarque 4.1 Un point  $(x; y)$  appartient à une droite s'il satisfait son équation  $y = mx + h$ .


Exemple 4.1 Le point  $(5; 6)$  appartient-il à la droite  $y = 2x + 1$  ?

$$y \stackrel{?}{=} 2x + 1 \Rightarrow 6 \stackrel{?}{=} 2 \cdot 5 + 1 \Leftrightarrow 6 \stackrel{?}{=} 11 \Rightarrow \text{Non !}$$


Exercice 4.1 Le point  $(-4; 2)$  appartient-il à la droite  $y = -2x - 6$  ?

$$y \stackrel{?}{=} -2x - 6 \Rightarrow 2 \stackrel{?}{=} (-2) \cdot (-4) - 6 \Leftrightarrow 2 \stackrel{?}{=} 2 \Rightarrow \text{Oui !}$$

Exemple 4.2 Trouver par calcul l'équation de la droite passant par les points  $A(5, 2)$  et  $B(-1, 4)$ .




Exemple 4.2 Trouver par calcul l'équation de la droite passant par les points  $A(5, 2)$  et  $B(-1, 4)$ .




Soit  $y = mx + h$  l'équation de la droite.

Exemple 4.2 Trouver par calcul l'équation de la droite passant par les points  $A(5, 2)$  et  $B(-1, 4)$ .



Soit  $y = mx + h$  l'équation de la droite. Si les deux points appartiennent à la droite, ils satisfont les deux l'équation  $y = mx + h$ .

Exemple 4.2 Trouver par calcul l'équation de la droite passant par les points  $A(5, 2)$  et  $B(-1, 4)$ .




Soit  $y = mx + h$  l'équation de la droite. Si les deux points appartiennent à la droite, ils satisfont les deux l'équation  $y = mx + h$ .

On a donc :

$$\left\{ \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right. = m \cdot \quad + h$$

Exemple 4.2 Trouver par calcul l'équation de la droite passant par les points  $A(5, 2)$  et  $B(-1, 4)$ .




Soit  $y = mx + h$  l'équation de la droite. Si les deux points appartiennent à la droite, ils satisfont les deux l'équation  $y = mx + h$ .

On a donc :

$$\begin{cases} 2 = m \cdot 5 + h \end{cases}$$

Exemple 4.2 Trouver par calcul l'équation de la droite passant par les points  $A(5, 2)$  et  $B(-1, 4)$ .




Soit  $y = mx + h$  l'équation de la droite. Si les deux points appartiennent à la droite, ils satisfont les deux l'équation  $y = mx + h$ .

On a donc :

$$\begin{cases} 2 = m \cdot 5 + h \\ \phantom{2} = m \cdot \phantom{5} + h \end{cases}$$

Exemple 4.2 Trouver par calcul l'équation de la droite passant par les points  $A(5, 2)$  et  $B(-1, 4)$ .




Soit  $y = mx + h$  l'équation de la droite. Si les deux points appartiennent à la droite, ils satisfont les deux l'équation  $y = mx + h$ .

On a donc :

$$\begin{cases} 2 = m \cdot 5 + h \\ 4 = m \cdot (-1) + h \end{cases}$$



Exemple 4.2 Trouver par calcul l'équation de la droite passant par les points  $A(5, 2)$  et  $B(-1, 4)$ .



Soit  $y = mx + h$  l'équation de la droite. Si les deux points appartiennent à la droite, ils satisfont les deux l'équation  $y = mx + h$ .

On a donc :

$$\begin{cases} 2 = m \cdot 5 + h \\ 4 = m \cdot (-1) + h \end{cases}$$

Il faut résoudre le système pour trouver  $m$  et  $h$ .

On résoud par combinaison linéaire

$$\begin{cases} 2 = m \cdot 5 + h \\ 4 = m \cdot (-1) + h \end{cases}$$

On résoud par combinaison linéaire

$$\begin{cases} 2 = m \cdot 5 + h \\ 4 = m \cdot (-1) + h \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2 = 5m + h \\ 4 = -m + h \end{cases}$$

On résoud par combinaison linéaire

$$\begin{cases} 2 = m \cdot 5 + h \\ 4 = m \cdot (-1) + h \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2 = 5m + h \\ 4 = -m + h \end{cases} \boxed{\cdot(-1)}$$

On résoud par combinaison linéaire

$$\begin{cases} 2 = m \cdot 5 + h \\ 4 = m \cdot (-1) + h \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2 = 5m + h \\ 4 = -m + h \end{cases} \boxed{\cdot(-1)} \Leftrightarrow \begin{cases} 2 = 5m + h \\ -4 = m - h \end{cases}$$

On résoud par combinaison linéaire

$$\begin{cases} 2 = m \cdot 5 + h \\ 4 = m \cdot (-1) + h \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2 = 5m + h \\ 4 = -m + h \cdot \boxed{(-1)} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2 = 5m + h \\ -4 = m - h \end{cases}$$

On additionne les deux équations

$$\begin{array}{r} 2 = 5m + h \\ \boxed{+} \quad -4 = m - h \\ \hline \end{array}$$

On résoud par combinaison linéaire

$$\begin{cases} 2 = m \cdot 5 + h \\ 4 = m \cdot (-1) + h \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2 = 5m + h \\ 4 = -m + h \end{cases} \boxed{\cdot(-1)} \Leftrightarrow \begin{cases} 2 = 5m + h \\ -4 = m - h \end{cases}$$

On additionne les deux équations

$$\begin{array}{r} 2 = 5m + h \\ \boxed{+} \quad -4 = m - h \\ \hline -2 = 6m \end{array}$$

On résoud par combinaison linéaire

$$\begin{cases} 2 = m \cdot 5 + h \\ 4 = m \cdot (-1) + h \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2 = 5m + h \\ 4 = -m + h \end{cases} \boxed{\cdot(-1)} \Leftrightarrow \begin{cases} 2 = 5m + h \\ -4 = m - h \end{cases}$$

On additionne les deux équations

$$\begin{array}{r} 2 = 5m + h \\ \boxed{+} \quad -4 = m - h \\ \hline -2 = 6m \end{array}$$

On a donc  $m = \frac{-2}{6} = -\frac{1}{3}$ .



On résoud par combinaison linéaire

$$\begin{cases} 2 = m \cdot 5 + h \\ 4 = m \cdot (-1) + h \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2 = 5m + h \\ 4 = -m + h \end{cases} \cdot (-1) \Leftrightarrow \begin{cases} 2 = 5m + h \\ -4 = m - h \end{cases}$$

On additionne les deux équations

$$\begin{array}{r} 2 = 5m + h \\ \boxed{+} \quad -4 = m - h \\ \hline -2 = 6m \end{array}$$

On a donc  $m = \frac{-2}{6} = -\frac{1}{3}$ . On remplace dans l'une des équations :

$$2 = 5m + h$$

On résoud par combinaison linéaire

$$\begin{cases} 2 = m \cdot 5 + h \\ 4 = m \cdot (-1) + h \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2 = 5m + h \\ 4 = -m + h \end{cases} \cdot (-1) \Leftrightarrow \begin{cases} 2 = 5m + h \\ -4 = m - h \end{cases}$$

On additionne les deux équations

$$\begin{array}{r} 2 = 5m + h \\ \boxed{+} \quad -4 = m - h \\ \hline -2 = 6m \end{array}$$

On a donc  $m = \frac{-2}{6} = -\frac{1}{3}$ . On remplace dans l'une des équations :

$$2 = 5m + h \Rightarrow 2 = 5 \cdot \left(-\frac{1}{3}\right) + h$$

On résoud par combinaison linéaire

$$\begin{cases} 2 = m \cdot 5 + h \\ 4 = m \cdot (-1) + h \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2 = 5m + h \\ 4 = -m + h \end{cases} \boxed{\cdot(-1)} \Leftrightarrow \begin{cases} 2 = 5m + h \\ -4 = m - h \end{cases}$$

On additionne les deux équations

$$\begin{array}{r} 2 = 5m + h \\ \boxed{+} \quad -4 = m - h \\ \hline -2 = 6m \end{array}$$

On a donc  $m = \frac{-2}{6} = -\frac{1}{3}$ . On remplace dans l'une des équations :

$$2 = 5m + h \Rightarrow 2 = 5 \cdot \left(-\frac{1}{3}\right) + h \Leftrightarrow h = 2 - 5 \cdot \left(-\frac{1}{3}\right)$$

On résoud par combinaison linéaire

$$\begin{cases} 2 = m \cdot 5 + h \\ 4 = m \cdot (-1) + h \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2 = 5m + h \\ 4 = -m + h \cdot (-1) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2 = 5m + h \\ -4 = m - h \end{cases}$$

On additionne les deux équations

$$\begin{array}{r} 2 = 5m + h \\ \boxed{+} \quad -4 = m - h \\ \hline -2 = 6m \end{array}$$

On a donc  $m = \frac{-2}{6} = -\frac{1}{3}$ . On remplace dans l'une des équations :

$$2 = 5m + h \Rightarrow 2 = 5 \cdot \left(-\frac{1}{3}\right) + h \Leftrightarrow h = 2 - 5 \cdot \left(-\frac{1}{3}\right) \Leftrightarrow h = \frac{6}{3} + \frac{5}{3}$$

On résoud par combinaison linéaire

$$\begin{cases} 2 = m \cdot 5 + h \\ 4 = m \cdot (-1) + h \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2 = 5m + h \\ 4 = -m + h \cdot (-1) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2 = 5m + h \\ -4 = m - h \end{cases}$$

On additionne les deux équations

$$\begin{array}{r} 2 = 5m + h \\ \boxed{+} \quad -4 = m - h \\ \hline -2 = 6m \end{array}$$

On a donc  $m = \frac{-2}{6} = -\frac{1}{3}$ . On remplace dans l'une des équations :

$$2 = 5m + h \Rightarrow 2 = 5 \cdot \left(-\frac{1}{3}\right) + h \Leftrightarrow h = 2 - 5 \cdot \left(-\frac{1}{3}\right) \Leftrightarrow h = \frac{6}{3} + \frac{5}{3} \Leftrightarrow h = \frac{11}{3}$$

On résoud par combinaison linéaire

$$\begin{cases} 2 = m \cdot 5 + h \\ 4 = m \cdot (-1) + h \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2 = 5m + h \\ 4 = -m + h \end{cases} \cdot (-1) \Leftrightarrow \begin{cases} 2 = 5m + h \\ -4 = m - h \end{cases}$$

On additionne les deux équations

$$\begin{array}{r} 2 = 5m + h \\ \boxed{+} \quad -4 = m - h \\ \hline -2 = 6m \end{array}$$

On a donc  $m = \frac{-2}{6} = -\frac{1}{3}$ . On remplace dans l'une des équations :

$$2 = 5m + h \Rightarrow 2 = 5 \cdot \left(-\frac{1}{3}\right) + h \Leftrightarrow h = 2 - 5 \cdot \left(-\frac{1}{3}\right) \Leftrightarrow h = \frac{6}{3} + \frac{5}{3} \Leftrightarrow h = \frac{11}{3}$$

On a donc  $y = -\frac{1}{3}x + \frac{11}{3}$ .

Exemple 4.3 Calculer l'intersection  $I(x_I, y_I)$  des droites  $y = 3x + 2$   
et  $y = -2x + 4$ .

Exemple 4.3 Calculer l'intersection  $I(x_I, y_I)$  des droites  $y = 3x + 2$  et  $y = -2x + 4$ .

Le point  $I(x_I, y_I)$  appartient aux deux droites, on a donc



Exemple 4.3 Calculer l'intersection  $I(x_I, y_I)$  des droites  $y = 3x + 2$  et  $y = -2x + 4$ .

Le point  $I(x_I, y_I)$  appartient aux deux droites, on a donc

$$\begin{cases} y_I = 3x_I + 2 \\ y_I = -2x_I + 4 \end{cases}$$

Exemple 4.3 Calculer l'intersection  $I(x_I, y_I)$  des droites  $y = 3x + 2$  et  $y = -2x + 4$ .

Le point  $I(x_I, y_I)$  appartient aux deux droites, on a donc

$$\begin{cases} y_I = 3x_I + 2 \\ y_I = -2x_I + 4 \end{cases}$$

On a donc, par substitution,

$$3x_I + 2 = -2x_I + 4 \quad |$$

Exemple 4.3 Calculer l'intersection  $I(x_I, y_I)$  des droites  $y = 3x + 2$  et  $y = -2x + 4$ .

Le point  $I(x_I, y_I)$  appartient aux deux droites, on a donc

$$\begin{cases} y_I = 3x_I + 2 \\ y_I = -2x_I + 4 \end{cases}$$

On a donc, par substitution,

$$3x_I + 2 = -2x_I + 4 \quad | \quad -2 + 2x_I$$

Exemple 4.3 Calculer l'intersection  $I(x_I, y_I)$  des droites  $y = 3x + 2$  et  $y = -2x + 4$ .

Le point  $I(x_I, y_I)$  appartient aux deux droites, on a donc

$$\begin{cases} y_I = 3x_I + 2 \\ y_I = -2x_I + 4 \end{cases}$$

On a donc, par substitution,

$$\begin{array}{rcl} 3x_I + 2 & = & -2x_I + 4 \\ \Leftrightarrow 5x_I & = & 2 \end{array} \quad \left| \begin{array}{l} -2 + 2x_I \end{array} \right.$$

Exemple 4.3 Calculer l'intersection  $I(x_I, y_I)$  des droites  $y = 3x + 2$  et  $y = -2x + 4$ .

Le point  $I(x_I, y_I)$  appartient aux deux droites, on a donc

$$\begin{cases} y_I = 3x_I + 2 \\ y_I = -2x_I + 4 \end{cases}$$

On a donc, par substitution,

$$\begin{array}{r|l} 3x_I + 2 = -2x_I + 4 & -2 + 2x_I \\ \Leftrightarrow 5x_I = 2 & \div 5 \end{array}$$

Exemple 4.3 Calculer l'intersection  $I(x_I, y_I)$  des droites  $y = 3x + 2$  et  $y = -2x + 4$ .

Le point  $I(x_I, y_I)$  appartient aux deux droites, on a donc

$$\begin{cases} y_I = 3x_I + 2 \\ y_I = -2x_I + 4 \end{cases}$$

On a donc, par substitution,

$$\begin{aligned} 3x_I + 2 &= -2x_I + 4 & \left| \begin{array}{l} -2 + 2x_I \\ \hline \div 5 \end{array} \right. \\ \Leftrightarrow 5x_I &= 2 \\ \Leftrightarrow x_I &= \frac{2}{5} \end{aligned}$$

Exemple 4.3 Calculer l'intersection  $I(x_I, y_I)$  des droites  $y = 3x + 2$  et  $y = -2x + 4$ .

Le point  $I(x_I, y_I)$  appartient aux deux droites, on a donc

$$\begin{cases} y_I = 3x_I + 2 \\ y_I = -2x_I + 4 \end{cases}$$

On a donc, par substitution,

$$\begin{array}{l} 3x_I + 2 = -2x_I + 4 \\ \Leftrightarrow 5x_I = 2 \\ \Leftrightarrow x_I = \frac{2}{5} \end{array} \left| \begin{array}{l} -2 + 2x_I \\ \div 5 \end{array} \right.$$

On remplace dans l'une des équations :

$$y_I = 3 \cdot \frac{2}{5} + 2$$

Exemple 4.3 Calculer l'intersection  $I(x_I, y_I)$  des droites  $y = 3x + 2$  et  $y = -2x + 4$ .

Le point  $I(x_I, y_I)$  appartient aux deux droites, on a donc

$$\begin{cases} y_I = 3x_I + 2 \\ y_I = -2x_I + 4 \end{cases}$$

On a donc, par substitution,

$$\begin{aligned} 3x_I + 2 &= -2x_I + 4 & \left| \begin{array}{l} -2 + 2x_I \\ \hline \div 5 \end{array} \right. \\ \Leftrightarrow 5x_I &= 2 \\ \Leftrightarrow x_I &= \frac{2}{5} \end{aligned}$$

On remplace dans l'une des équations :

$$y_I = 3 \cdot \frac{2}{5} + 2 \Leftrightarrow y_I = \frac{6}{5} + \frac{10}{5}$$



Exemple 4.3 Calculer l'intersection  $I(x_I, y_I)$  des droites  $y = 3x + 2$  et  $y = -2x + 4$ .

Le point  $I(x_I, y_I)$  appartient aux deux droites, on a donc

$$\begin{cases} y_I = 3x_I + 2 \\ y_I = -2x_I + 4 \end{cases}$$

On a donc, par substitution,

$$\begin{array}{rcl} 3x_I + 2 & = & -2x_I + 4 \quad \left| \begin{array}{l} -2 + 2x_I \\ \hline \div 5 \end{array} \right. \\ \Leftrightarrow 5x_I & = & 2 \\ \Leftrightarrow x_I & = & \frac{2}{5} \end{array}$$

On remplace dans l'une des équations :

$$y_I = 3 \cdot \frac{2}{5} + 2 \Leftrightarrow y_I = \frac{6}{5} + \frac{10}{5} \Leftrightarrow y_I = \frac{16}{5}$$

Exemple 4.3 Calculer l'intersection  $I(x_I, y_I)$  des droites  $y = 3x + 2$  et  $y = -2x + 4$ .

Le point  $I(x_I, y_I)$  appartient aux deux droites, on a donc

$$\begin{cases} y_I = 3x_I + 2 \\ y_I = -2x_I + 4 \end{cases}$$

On a donc, par substitution,

$$\begin{array}{rcl} 3x_I + 2 & = & -2x_I + 4 \quad \left| \begin{array}{l} -2 + 2x_I \\ \hline \div 5 \end{array} \right. \\ \Leftrightarrow 5x_I & = & 2 \\ \Leftrightarrow x_I & = & \frac{2}{5} \end{array}$$

On remplace dans l'une des équations :


$$y_I = 3 \cdot \frac{2}{5} + 2 \Leftrightarrow y_I = \frac{6}{5} + \frac{10}{5} \Leftrightarrow y_I = \frac{16}{5}$$

On a donc  $I(\frac{2}{5}, \frac{16}{5})$ .

Remarque 4.2 La pente et l'ordonnée à l'origine de deux droites  $y = m_1x + h_1$  et  $y = m_2x + h_2$  nous permettent de déduire la **position relative** des droites.


Remarque 4.2 La pente et l'ordonnée à l'origine de deux droites  $y = m_1x + h_1$  et  $y = m_2x + h_2$  nous permettent de déduire la **position relative** des droites.

On distingue trois cas :




Remarque 4.2 La pente et l'ordonnée à l'origine de deux droites  $y = m_1x + h_1$  et  $y = m_2x + h_2$  nous permettent de déduire la **position relative** des droites.

On distingue trois cas :




Remarque 4.2 La pente et l'ordonnée à l'origine de deux droites  $y = m_1x + h_1$  et  $y = m_2x + h_2$  nous permettent de déduire la **position relative** des droites.

On distingue trois cas :




Remarque 4.2 La pente et l'ordonnée à l'origine de deux droites  $y = m_1x + h_1$  et  $y = m_2x + h_2$  nous permettent de déduire la **position relative** des droites.

On distingue trois cas :



Remarque 4.2 La pente et l'ordonnée à l'origine de deux droites  $y = m_1x + h_1$  et  $y = m_2x + h_2$  nous permettent de déduire la **position relative** des droites.

On distingue trois cas :




Droites sécantes  
 $m_1 \neq m_2$



Remarque 4.2 La pente et l'ordonnée à l'origine de deux droites  $y = m_1x + h_1$  et  $y = m_2x + h_2$  nous permettent de déduire la **position relative** des droites.


On distingue trois cas :



Droites sécantes  
 $m_1 \neq m_2$

Remarque 4.2 La pente et l'ordonnée à l'origine de deux droites  $y = m_1x + h_1$  et  $y = m_2x + h_2$  nous permettent de déduire la **position relative** des droites.

On distingue trois cas :




Droites sécantes


$$m_1 \neq m_2$$

Remarque 4.2 La pente et l'ordonnée à l'origine de deux droites  $y = m_1x + h_1$  et  $y = m_2x + h_2$  nous permettent de déduire la **position relative** des droites.


On distingue trois cas :



Droites sécantes  
 $m_1 \neq m_2$




Droites parallèles  
 $m_1 = m_2$   
 $h_1 \neq h_2$




Remarque 4.2 La pente et l'ordonnée à l'origine de deux droites  $y = m_1x + h_1$  et  $y = m_2x + h_2$  nous permettent de déduire la **position relative** des droites.


On distingue trois cas :



Droites sécantes  
 $m_1 \neq m_2$




Droites parallèles  
 $m_1 = m_2$   
 $h_1 \neq h_2$




Remarque 4.2 La pente et l'ordonnée à l'origine de deux droites  $y = m_1x + h_1$  et  $y = m_2x + h_2$  nous permettent de déduire la **position relative** des droites.


On distingue trois cas :



Droites sécantes  
 $m_1 \neq m_2$




Droites parallèles  
 $m_1 = m_2$   
 $h_1 \neq h_2$




Remarque 4.2 La pente et l'ordonnée à l'origine de deux droites  $y = m_1x + h_1$  et  $y = m_2x + h_2$  nous permettent de déduire la **position relative** des droites.


On distingue trois cas :



Droites sécantes  
 $m_1 \neq m_2$




Droites parallèles  
 $m_1 = m_2$   
 $h_1 \neq h_2$



Droites confondues  
 $m_1 = m_2$   
 $h_1 = h_2$


Remarque 4.2 La pente et l'ordonnée à l'origine de deux droites  $y = m_1x + h_1$  et  $y = m_2x + h_2$  nous permettent de déduire la **position relative** des droites.

On distingue trois cas :




Droites sécantes  
 $m_1 \neq m_2$

Une intersection  
 $S = \{(x_I, y_I)\}$




Droites parallèles  
 $m_1 = m_2$   
 $h_1 \neq h_2$



Droites confondues  
 $m_1 = m_2$   
 $h_1 = h_2$


Remarque 4.2 La pente et l'ordonnée à l'origine de deux droites  $y = m_1x + h_1$  et  $y = m_2x + h_2$  nous permettent de déduire la **position relative** des droites.

On distingue trois cas :




Droites sécantes  
 $m_1 \neq m_2$

Une intersection  
 $S = \{(x_I, y_I)\}$



Droites parallèles  
 $m_1 = m_2$   
 $h_1 \neq h_2$

Pas d'intersections  
 $S = \emptyset$




Droites confondues  
 $m_1 = m_2$   
 $h_1 = h_2$




Remarque 4.2 La pente et l'ordonnée à l'origine de deux droites  $y = m_1x + h_1$  et  $y = m_2x + h_2$  nous permettent de déduire la **position relative** des droites.

On distingue trois cas :




Droites sécantes  
 $m_1 \neq m_2$

Une intersection  
 $S = \{(x_I, y_I)\}$



Droites parallèles  
 $m_1 = m_2$   
 $h_1 \neq h_2$

Pas d'intersections  
 $S = \emptyset$



Droites confondues  
 $m_1 = m_2$   
 $h_1 = h_2$

Infinité d'intersections  
 $S = \{(x, y) | y = m_1x + h_1\}$