

GYMNASE DE BURIER

## Chapitre 4 - Fonctions

Sarah Dégallier Rochat

### Références

H. Bovet, "Analyse", Polymaths, 2002

Notes du cours donné par M. Gelsomino (2005-2008), Gymnase de Burier

# 1. La notion de fonction

Définition 1.1 Une fonction  $f$  d'un ensemble  $D$  dans un ensemble  $A$  est une correspondance qui associe à **chaque élément de  $D$  un et un seul élément de  $A$** .

On note


$$\begin{aligned} f : D &\rightarrow A \\ x &\mapsto f(x) \end{aligned}$$

où l'on appelle

- ▶  $D$  : l'ensemble de **départ**
- ▶  $A$  : l'ensemble d'**arrivée**
- ▶  $f(x)$  : l'**expression fonctionnelle** de  $f$

Exemple 1.1 Des élèves de Burier prennent le train pour rentrer chez eux. Jacques et Simone descendent à La Tour-de-Peilz, Sophie, Vanessa et Pierre à Vevey et Francis à Rivaz. Personne ne descend à Saint-Saphorin.

*Ensemble de départ*



La relation associant les passagers à leur destination est une **fonction**. En effet, tous les passagers descendent à **un et un seul** arrêt. Toutes les personnes doivent descendre du train et elles ne peuvent descendre qu'à un seul arrêt.

Définition 1.2 Soit la fonction  $f$  donnée par

$$\begin{aligned} f : D &\rightarrow A \\ x &\mapsto f(x) \end{aligned}$$

1.  $y = f(x)$  est l'**image** de  $x$  par  $f$ .
  2.  $x$  est la **préimage** de  $y$ .
  3. L'image de  $f$ , notée  $\text{Im}(f)$ , est l'ensemble des éléments de  $A$  qui ont une **préimage**.
  4. L'image réciproque de  $y$ , notée  ${}^r f(y)$  ou  $f^{-1}(y)$ , est l'**ensemble** des éléments de  $D$  qui ont  $y$  pour image.
- Une fonction peut aussi être donnée par son **graphe**  $G(f)$

$$G(f) = \{(x; f(x)) \mid x \in D\}$$

Exercice 1.1 Dans l'exemple du train, donner

1. l'image de Pierre :  $f(\text{Pierre}) = \text{Vevey}$

2. l'image de la fonction :

$$\text{Im}(f) = \{ \text{La Tour-de-Peilz}, \text{Vevey}, \text{Rivaz} \}$$

3. la préimage de Rivaz : Francis

4. l'image réciproque de la Tour-de-Peilz :

$${}^r f(\text{La Tour-de-Peilz}) = \{ \text{Jacques}, \text{Simone} \}$$

5. l'image réciproque de Saint-Saphorin :

$${}^r f(\text{Saint-Saphorin}) = \emptyset$$


6. le graphe de la fonction :

$$G(f) = \{ (\text{Jacques}, \text{La Tour-de-Peilz}); \\ (\text{Simone}, \text{La Tour-de-Peilz}); (\text{Sophie}, \text{Vevey}); \\ (\text{Vanessa}, \text{Vevey}); (\text{Pierre}, \text{Vevey}); (\text{Francis}, \text{Rivaz}) \}$$

## 2. Les fonctions réelles

Lorsque les ensembles de **départ**  $D$  et d'**arrivée**  $A$  d'une fonction sont des **sous-ensembles de  $\mathbb{R}$** , on dit que la fonction est **réelle**.  
L'**analyse** est la discipline des maths qui étudie les fonctions réelles.

Pour représenter le graphe  $G(f) = \{(x; f(x)) | x \in D\}$  d'une fonction réelle, on utilise un **système d'axes** perpendiculaires.




On place l'**ensemble de départ**  $D$  sur l'axe horizontal (abscisse) et l'**ensemble d'arrivée**  $A$  sur l'axe vertical (ordonnées).

## Exemple 2.1 Dessiner le graphe de la fonction

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto x^2$$

et répondre aux questions suivantes.




1.  $f(-2) = 4$

2.  ${}^r f(1) = \{-1; 1\}$

3.  $Im(f) = \mathbb{R}_+$

Exercice 2.1 Estimer les valeurs suivantes en observant le graphe.



1.  $f(0) = -1$

2.  $f(1) = -2$


3.  ${}^r f(2) = \{\frac{7}{2}\}$

4.  ${}^r f(-1) = \{-3; 0; 3\}$



### 3. La composition de fonctions

Définition 3.1 Soit deux fonctions  $f : E \rightarrow F$  et  $g : F \rightarrow G$ , on définit la **composée** de  $g$  avec  $f$  comme  $g \circ f(x) = g(f(x))$ .



Remarque 3.1 Dans l'expression  $g \circ f$ , c'est toujours la **dernière fonction** (ici  $f$ ) qui s'applique en premier, contrairement au sens de lecture.

Exemple 3.1 Soit les fonctions

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} & \text{et} & & g : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto x^2 & & & x &\mapsto 3x - 1. \end{aligned}$$

Donner la valeur ou l'expression générale des termes suivants :

1.  $g \circ f(-2) = g(f(-2)) = g((-2)^2) = g(4) = 3 \cdot 4 - 1 = 11$

2.  $g \circ f(x) = g(f(x)) = g(x^2) = 3 \cdot x^2 - 1 = 3x^2 - 1$

3.  $g \circ f(5) = 3 \cdot 5^2 - 1 = 3 \cdot 25 - 1 = 74$

4.  $f \circ g(-2) = f(g(-2)) = f(3 \cdot (-2) - 1) = f(-7) = (-7)^2 = 49$

5.  $f \circ g(x) = f(g(x)) = f(3x - 1) = (3x - 1)^2$

6.  $f \circ g(5) = (3 \cdot 5 - 1)^2 = 14^2 = 196$

## 4. L'ensemble de définition ED(f)

Exemple 4.1 Soit la relation  $x \mapsto \frac{1}{x}$ . Donner le plus grand ensemble de départ possible pour que cette relation soit une fonction (réelle).

*On sait que dans une fonction chaque élément de l'ensemble de départ doit avoir une image.*

*Or,  $\frac{1}{x}$  n'est pas défini lorsque  $x = 0$ . 0 n'a donc pas d'image. On doit donc l'enlever de l'ensemble de départ pour que la relation soit une fonction. On a donc*

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}^* &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto \frac{1}{x} \end{aligned}$$

Définition 4.1 L'ensemble de définition d'une fonction  $f$  est composé de tous les éléments de  $\mathbb{R}$  qui possèdent une image. Autrement dit, il s'agit de tous les nombres pour lesquels la fonction est définie. On le note  $ED(f)$ .

Exercice 4.1 Donner les ensembles de définition des fonctions suivantes.

$$1. f : x \mapsto 3x^2 - 7x + 3 \quad ED(f) = \mathbb{R}$$

$$2. f : x \mapsto \frac{4}{x+3} \quad ED(f) = \mathbb{R} \setminus \{-3\}$$

$$3. f : x \mapsto \frac{4}{x^2 - 25} \quad ED(f) = \mathbb{R} \setminus \{-5; 5\}$$

$$4. f : x \mapsto \sqrt{x} \quad ED(f) = \mathbb{R}_+$$

$$5. f : x \mapsto \log(x) \quad ED(f) = \mathbb{R}_+^*$$

Plus généralement :

1. Si la fonction est **polynomiale** :

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0,$$

tous les nombres ont une image.

Exemple  $f(x) = 4x^7 - 3x + 7$   $ED(f) = \mathbb{R}$

2. Si la fonction est **rationnelle** :  $f(x) = \frac{N(x)}{D(x)}$ , il faut enlever toutes les valeurs qui annulent le dénominateur  $D(x)$ .

Exemple  $f(x) = \frac{x+1}{x-4}$   $ED(f) = \mathbb{R} \setminus \{4\}$

3. Si la fonction est **irrationnelle** :  $f(x) = \sqrt{R(x)}$ , il faut enlever toutes les valeurs pour lesquelles  $R(x) < 0$ .

Exemple  $f(x) = \sqrt{x-7}$   $ED(f) = [7; +\infty[$

4. Si la fonction est **logarithmique** :  $f(x) = \log_a(P(X))$ , il faut enlever toutes les valeurs pour lesquelles  $P(x) \leq 0$ .

Exemple  $f(x) = \log_2 2 - x$   $ED(f) = ] - \infty; 2[$

## 5. Etudes de fonction

Lorsque l'on **étudie une fonction**  $f$ , les premières étapes sont les suivantes :

1. Rechercher l'**ensemble de définition**  $ED(f)$
2. Rechercher les **zéros** de la fonction (les valeurs telles que  $f(x) = 0$ )
3. Rechercher l'**ordonnée à l'origine** ( $f(0)$ ) si  $0 \in ED(f)$
4. Etudier le **signe** de la fonction (par un tableau de signes)

L'étude de fonction nous renseigne sur sa **représentation graphique**.

1. L'ensemble de définition indique **où la fonction est définie**
2. Les zéros indiquent **où la courbe traverse l'axe des  $x$**
3. L'ordonnée à l'origine indique **où la courbe traverse l'axe des  $y$**
4. Le signe de la fonction indique **si la courbe est au-dessus (+) ou au-dessous (-) de l'axe des  $x$**

Exemple 5.1 Etudier la fonction  $f(x) = \sqrt{1-x^2}$  et esquisser son graphe.

*On commence par chercher  $ED(f)$ . La fonction est définie lorsque*

$$1 - x^2 \geq 0 \Leftrightarrow (1 - x)(1 + x) \geq 0$$

*Les zéros sont -1 et 1. On doit faire un tableau de signes :*


$x$	$-\infty$	$-1$	$1$	$+\infty$
$1 + x$		-	0	+
$1 - x$		+	0	-
$1 - x^2$		-	0	-

*L'ensemble de définition est donc  $ED(f) = [-1; 1]$ . L'ordonnée à l'origine vaut*

$$f(0) = \sqrt{1 - 0^2} = 1$$

En résumé, l'ordonnée à l'origine vaut  $1$  et l'on a :

$x$	$-\infty$	$-1$	$1$	$+\infty$
$f(x)$				





**Exercice 5.1** Etudier la fonction  $f(x) = x^3 - 4x$  et esquisser son graphe.

C'est une fonction polynomiale, donc  $ED(f) = \mathbb{R}$ . On cherche les zéros (on résoud  $f(x) = 0$ ) :


$$\begin{aligned} x^3 - 4x &= 0 && \left| \begin{array}{l} MEE \\ PR[A^2 - B^2 = (A - B)(A + B)] \end{array} \right. \\ \Leftrightarrow x(x^2 - 4) &= 0 && \\ \Leftrightarrow x(x - 2)(x + 2) &= 0 && \Rightarrow S = \{-2; 0; 2\} \end{aligned}$$

On fait le tableau de signes :

$x$	$-\infty$	$-2$	$0$	$2$	$+\infty$	
$x + 2$		-	0	+	+	
$x$		-	0	+	+	
$x - 2$		-	-	0	+	
$f(x)$		-	0	+	0	+

L'ordonnée à l'origine vaut

$$f(0) = 0^3 - 4 \cdot 0 = 0$$



Exemple 5.2 Etudier la fonction  $f(x) = \frac{x^2 + 2}{x^2 - 1}$  et esquisser son graphe.

On a  $f(x) = \frac{x^2 + 2}{x^2 - 1} \frac{x^2 + 2}{(x + 1)(x - 1)}$ . On a donc  $ED(f) = \mathbb{R} \setminus \{-1; 1\}$ .


On cherche les zéros (on résoud  $f(x) = 0$ ) :

$$\Leftrightarrow \underbrace{x^2 + 2}_{\Delta < 0} = 0 \quad \left| \quad \Delta \right. \quad \Rightarrow S = \emptyset$$

On fait le tableau de signes :


$x$	$-\infty$	$-1$	$1$	$+\infty$
$x^2 + 2$	+	+	+	+
$x + 1$	-	+	+	+
$x - 1$	-	-	+	+
$f(x)$	-	-	+	+

L'ordonnée à l'origine vaut  $f(0) = \frac{0^2 + 2}{0^2 - 1} = -2$ .




Exercice 5.2 Sur la base des informations suivantes, esquisser le graphe de  $f$ . On sait que  $ED(f) = ]-\infty; 7[$ ,  $f(0) = -1$  et

$x$	$-\infty$	$-3$	$-1$	$7$	$+\infty$		
$f(x)$		$-$	$0$	$+$	$0$	$-$	




## 6. Continuité

Définition 6.1 On dit qu'une fonction est **continue en un point** si on peut la "dessiner sans lever le crayon" au voisinage de ce point. Une fonction continue en tout point de son domaine de définition est dite **continue**.



$f$  est continue en  $a$  et en  $b$ .




$f$  est continue en  $b$   
mais discontinue en  $a$ .

Définition 6.2 La fonction "partie entière" pour une valeur  $x$  est le nombre entier  $n$  tel que  $n \leq x < n + 1$ . On note  $f(x) = [x]$ . Par exemple,

$$[2.7] = 2 \quad [-3.515] = -4 \quad [6] = 6$$

Exemple 6.1 Dessiner le graphe de la fonction réelle  $f(x) = [x]$ . Est-elle continue? *Non, elle est **discontinue** pour chaque  $x \in \mathbb{Z}$ .*



Remarque 6.1 La notion de continuité n'a de sens que **dans le domaine de définition** de la fonction. Il ne faut donc pas confondre **discontinu en un point** et **non-défini en un point**.

Exemple 6.2 Esquisser le graphe de la fonction  $f(x) = \frac{3}{x-2}$ .

Est-elle continue? *Oui, elle est continue. En effet, elle n'est pas définie en 2, mais elle **continue en tous les points de son domaine de définition** ( $ED(f) = \mathbb{R} \setminus \{2\}$ ).*

